

BENZYLBenzoat NAF 25 % Liniment**BRUKSRETTLEDNING FOR SKABBKUR**

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du starter behandling. Det anbefales å starte behandling om kvelden.

- Dusj og tørk kroppen godt
- Klipp og rens alle negler
- Start innsmøringen ca. 15 minutter etter å ha dusjet. Huden må være helt tørr og ha normaltemperatur
- Bruk en kompress eller liknende til innsmøringen, kast denne etter bruk
- Liniment smøres over **hele** kroppen inkludert ansikt fra hårfestet og ned til og med føttene. Vanskelig tilgjengelige steder på kroppen, som ryggen, ørene og bak ørene, mellom fingre og tær, fotsålen, neglebånd, under neglene, i navlen, de ytre kjønnsorganer og rundt endetarmsåpningen må også smøres. **Unngå øyne og munn**
- Smør ekstra nøye på hendene, håndledd, føttene og anklene fordi de stedene er mest utsatte for skabb
- Benzylbenzoat skal påføres hele kroppen 2 ganger med ca 10 minutters mellomrom. Det er viktig at huden er helt tørr før innsmøring nr. 2
- Ved vask av hender før det har gått 24 timer, må hendene smøres igjen
- Benytt rent tøy/nattøy
- Etter 24 timer byttes sengetøy og klær. Linimentet dusjes eller vaskes av
- Samme prosedyre gjentas etter én uke

Behandling av barn:

Behandling av barn under 7 år må gjøres i samråd med lege. Ved fortykning av liniment benyttes Kalisåpesprit (varenr 298496, Spiritus saponis kalini).

Graviditet og amming:

Opplysninger mangler. Rådfør deg med lege eller apotek før bruk.

Advarsler:

- MÅ ikke få preparatet i øynene. Skyll straks med vann eller fysiologisk saltvannssoppløsning/øyebadevann. Kontakt lege
- Preparatet er brannfarlig. Du skal ikke røyke eller være i nærheten av åpne flammer når du påfører linimentet, eller rett etter at det er påført
- Kan gi smerte og svie ved påføring
- Produktet kan sette flekker på klær og overflater

Annet:

Alle personer som tilhører samme husholdning og eventuelle seksualpartnere må behandles samtidig.

Rengjøring av tekstiler og gjenstander er viktig for å forhindre smitte.

For mer informasjon, se «Skabb-veileder for helsepersonell» fra

Folkehelseinstituttet, FHI.no

Dersom man fortsatt har symptomer fire uker etter behandling, kontakt lege.